

# Biorga Contra gegen Pilzkrankheiten



## Bekämpft Pilzkrankheiten wie Echten Mehltau, Schorf, Blüten- und Zweigdürre sowie Fruchtmonilia.

Biorga Contra gegen Pilzkrankheiten bekämpft auf natürliche Weise Echten Mehltau, Schorf, Blüten- und Zweigdürre sowie Fruchtmonilia bei Gemüse, Kräutern, Beeren und Obst, Reben und Zierpflanzen. Das Konzentrat wird in Wasser aufgelöst und die Pflanzen gleichmäßig eingesprüht. Biorga Contra gegen Pilzkrankheiten sollte vorbeugend oder spätestens beim Sichtbarwerden der ersten Krankheitssymptome gespritzt werden.

### EMPLOI

Spritzbrühe gemäss Dosierung anröhren. Pflanzen gleichmäßig einsprühen. Auf eine gute Benetzung der Pflanzen achten.

### DOSAGE

Anwendung im Obst- und Beerenbau: Bei Erdbeeren 0,3 % (3 g/l Wasser) gegen Echten Mehltau von der Vollblüte bis zur Rotfärbung, Wartefrist 3 Tage. Heidel-, Johannis- und Stachelbeeren 0,4 % (4 g/l) im Stadium 50-90 % Fruchtansatz, Wartefrist 3 Tage. Him- und Brombeeren 0,3 % (3 g/l) von den ersten Blüten bis etwa 50 % offene Blüte, Wartefrist 3 Tage. Aprikosen 0,3 % (3 g/l) während der Blüte gegen Blüten- und Zweigdürre (Teilwirkung). Apfel und Birne 0,3 % (3 g/l) zusammen mit 0,2 % Schwefel gegen Schorf und Echten Mehltau, ab Austrieb, Wartefrist 8 Tage. Kirschen 0,2 % (2 g/l) während der Blüte gegen Blüten- und Zweigdürre (Teilwirkung), Wartefrist 14 Tage. Pfirsich und Nektarine 0,3 % (3 g/l) von der Blüte bis zur Reife gegen Blüten- und Zweigdürre sowie Fruchtmonilia. Reben 0,2 % (2 g/l) in Kombination mit 0,2 % Schwefel gegen Echten Mehltau von Fruchtansatz bis Reife, spätestens bis Mitte August. Gemüsebau: Auberginen, Gurken, Paprika und Tomaten 0,3 % (30 g/10 l) gegen Echten Mehltau, ab Befallsbeginn, 2-3 Behandlungen im Abstand von 8 Tagen, Wartefrist 3 Tage. Blatt-, Kopf- und Kohlgemüse, Kürbisgewächse, Sellerie, Fenchel, Pastinake und Petersilie 0,3 % (3 g/l) bei Befallsgefahr, Wartefrist 1 Tag. Kräuter und Salate: Küchen- und Medizinalkräuter, Melonen, Nüsslisalat und Zucchetti 5 g/l Wasser ab Befallsbeginn, Wartefrist 3 Tage. Zierpflanzen: Rosen, Bäume, Sträucher, Blumenkulturen und Grünpflanzen 0,3 % (3 g/l) gegen Echten Mehltau, ab Befallsbeginn im Abstand von 7-10 Tagen spritzen. Nicht bei hohen Temperaturen anwenden (Phytotox-Gefahr).

### ANNOTATION

SP1: Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrrichtabfuhr. Zur Entsorgung Mittelreste zur Notfallauskunft bei Vergiftungen: Tox Info Suisse, T. 145 oder 044 251 66 66.

<b>Conviens à</b>	Balcon, Jardin, Parterres fleuris, Pots, jardinières surélevées
<b>Durée d'efficacité</b>	immédiatement efficace
<b>Taille du conditionnement</b>	0.09 kg
<b>Dosage</b>	
<b>Saison</b>	Printemps, Été, Automne
<b>Produit</b>	Biorga Contra

### **Stockage**

Conserver le produit au sec, dans son emballage d'origine, hors de portée des enfants et des animaux. Le garder éloigné des denrées alimentaires et de l'alimentation pour animaux. Sa durée de conservation est illimitée s'il est stocké comme il se doit (à l'abri du gel et au sec). Employer les quantités restantes conformément aux recommandations d'utilisation ou les rapporter au point de vente dans leur emballage d'origine.

### **Élimination**

A déposer au centre de collecte des toxiques ou rapporter au point de vente.