
Biorga Contra Raupen-Stopp

Biologisches Raupenbekämpfungsmittel



Biorga Contra Raupen-Stopp bekämpft auf natürliche Weise Raupen und Larven bei Beeren, Obst, Zierpflanzen und Gemüse. Das Frassgift wirkt sehr schnell auf die Schädlinge. Bereits kurz nach der Behandlung stoppen die Schädlinge die Fressstätigkeit und sterben nach 2 – 3 Tagen.

ANWENDUNG

Spritzbrühe gemäss Dosierung anrühren. Pflanzen gleichmässig einsprühen, auf gute Benetzung achten. Nicht bei kaltem Wetter oder sehr kalkhaltigem Wasser anwenden.

DOSIERUNG

Erdbeeren: 1 g / 1 l Wasser für 10 m², bei Befallsbeginn, Wartefrist 3 Tage Kern- und Steinobst: Frostspanner & Gespinstmotten: 0,05 % (3 g / 6 l Wasser, 0,8 g / 10 m²), Wartefrist 2 Tage Schalenwickler: 0,0625 % (3 g / 4,8 l Wasser, 1 g / 10 m²), Wartefrist 2 Tage Reben: 0,05 % (3 g / 6 l Wasser, 0,6 g / 10 m²), 1 % Zucker zur Wirkungsverstärkung, max. 3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen Gemüse: 0,1 % (3 g / 3 l Wasser, 1 g / 10 m²), bei Befallsbeginn, Wartefrist 2 Tage Zierpflanzen: 0,1 % (3 g / 3 l Wasser), bei Befallsbeginn Buchsbäume: gegen Buchsbaumzünsler, bei Befallsbeginn

ZU BEACHTEN

SP1: Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Leere Gebinde ungereinigt zur Kehrrichtabfuhr. Zur Entsorgung Mittelreste zur Notfallauskunft bei Vergiftungen: Tox Info Suisse, T. 145 oder 044 251 66 66.

Geeignet für	Balkon, Blumenbeete, Garten, Gemüse, Hochbeet, Kübel, Moorbeet, Rabatten
Wirkzeit	sofort wirksam
Packgrössen	0.02 kg
Dosierung	
Saison	Frühling, Sommer, Herbst
Produkt	Biorga Contra

- **Biologisches Insektizid / Raupenbekämpfungsmittel**
- **Wirkstoff: *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*, Stamm EG 2348, 32000 IU/mg, 37,5 %**
- **Beistoff: 3,6-Dimethyl-4-octin-3,6-diol**
- **Eidg. Kontr. Nr. : W 7580-3**
- **Zulassung: Bewilligt für nichtberufliche Verwendung**

Lagerung

keine

Entsorgung

Leere Verpackungen ungereinigt der kommunalen Abfallentsorgung zuführen.