Hauert Borax

Pour réparer les carences en bore.

Engrais au bore pour l'épandage. Pour réparer les carences en bore. Les symptômes typiques de carence en bore sont la "pourriture sèche du cœur", la chlorose et les cavités dans la tige. La carence en bore se produit souvent pendant la sécheresse parce que le bore est absorbé par le flux de jus.

EMPLOI

A n’utiliser qu’en cas de besoin effectif. Ne pas dépasser la dose recommandée, notamment par rapport à la protection du sol. Pour les sols avec un pH supérieur à 7: fumure foliaire avec Hauert Solubor DF.

DOSAGE

- Grandes cultures (betteraves): 10 à 15 kg/ha
- Cultures maraîchères (céleri, betterave rouge, choux-fleurs): 5 à 10 kg/ha
- Arboriculture: jusqu'à 10 kg/ha
- Plante ornementales: 70 à 140 g/are

ANNOTATION

- Limitation de garantie Notre garantie porte sur la qualité du produit. Pas de résponsabilité de notre part concemant l’application.Ne pas absorber et tenir hors de portée des animaux.
- Danger: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque une sévère irritation des yeux. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Garder sous clef.

Convient à	Culture, Phase finale
Taille du conditionnement	1 kg
	25 kg
Dosage	2 g/m²
Saison	Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre

- **15 % B Bore**
- **Contient: Borax (ID. Nr. 12179-04-3)**

Périls

Stockage

A conserver au sec et dans des emballages fermés. Le produit se conserve indéfiniment.

Élimination

Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.