
Hauert Tardit Universal

Für Blumen, Gehölze und Dachgärten



Tardit Universal eignet sich besonders für Blumenrabatten, Stauden, Sträucher, Nadelgehölze und Dachgärten. Die Umhüllung gibt die ausgewogenen Nährstoffe kontrolliert und bedarfsgerecht frei. Eine Gabe Tardit versorgt die Pflanzen für eine ganze Saison.

ANWENDUNG

Verwenden Sie Tardit beim Anpflanzen und Säen oder als Unterhaltsdünger im Frühling.

DOSIERUNG

- Blühern: 40 – 60 g/m² beim Herrichten des Beetes einarbeiten.
- Sommerblumen: 50 – 80 g/m² beim Herrichten des Beetes einarbeiten.
- Blütenstauden: 50 – 80 g/m² im Frühjahr streuen.
- Blütensträucher, Nadelhölzer, Rosen, Dachgärten: Im Frühjahr (März/April) 80 – 100 g/m² streuen.
- Pflanzen in Grossgefässen (Tröge usw.): Im Frühjahr 150 g/m² streuen.

ZU BEACHTEN

- 1 Handvoll = 35 – 45 g
- 1 Joghurtbecher = 180 – 200 g

Geeignet für	Balkon, Blumenbeete, Garten, Gehölze, Gemüse, Kübel, Rabatten
Wirkzeit	eine Saison lang
Packgrössen	0.5 kg 1 kg 2.5 kg
Dosierung	95 g/m ²
Saison	Frühling
Produkt	Tardit

- **NPK (+Mg)-Dünger 14+7-14 (+1,5) mit Spurennährstoff, teilweise umhüllt**
- **15 % N Gesamtstickstoff**
 - 6,0 % NS Nitratstickstoff
 - 7,5 % NA Ammoniumstickstoff
 - 1,5 % NRf Stickstoff als Methylenharnstoff
- **7 % P₂O₅ Gesamtphosphat**
 - 6,4 % P₂O₅ Phosphat, wasserl.
- **14 % K₂O Wasserlösliches Kaliumoxid**
- **1,5 % Mg Magnesium**
 - 0,007 % B Bor
 - 0,03 % Cu Wasserlösliches Kupfer
 - 0,03 % Fe Eisen (0,03 % als Chelat von EDTA)
 - 0,05 % Mn Wasserlösliches Mangan
 - 0,009 % Mo Wasserlösliches Molybdän
 - 0,007 % Zn Wasserlösliches Zink
 - Chlorarm
- **90 % N des Stickstoffs als Langzeitstickstoff (N umhüllt)**

Lagerung

Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Unbeschränkt haltbar.

Entsorgung

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.